



Má testovaná osoba (klient či zaměstnanec/personál) příznaky odpovídající onemocnění COVID-19?

ANO

SYMPTOMATICKÝ

POC Antigenní Test^{1, 2}

Ag+

Ag-

Pacient je pozitivní

Pacient prodělává onemocnění COVID-19.
Není nutný konfirmační test PCR.
Nařízení izolace v nemocnici nebo v zařízení dle zdravotního stavu.

Nutno provést konfirmační test PCR.

Do doby výsledku PCR testu musí testovaná osoba dodržovat pravidla izolace. Dále se postupuje dle výsledku konfirmačního testu.

PCR+

PCR-

PCR TEST POZITIVNÍ

Další postup dle algoritmu MZ pro COVID pozitivní osoby

PCR TEST NEGATIVNÍ

Konzultace PL, při přetrvávání/zhoršování obtíží přetrvávajících déle jak 5 dní, zvážit opakování POC Ag/PCR testu.

NE

ASYMPTOMATICKÝ*

POC Antigenní test každých 5 dní³

Ag+

Ag-

Pacient je pozitivní

Nutno provést konfirmační PCR test.
Do výsledku PR testu musí testovaná osoba dodržovat pravidla izolace. Dále se postupuje dle výsledku konfirmačního testu.

Pokračovat v opakovaném testování.

PCR+

PCR-

PCR TEST POZITIVNÍ

Další postup dle algoritmu MZ pro COVID pozitivní osoby

PCR TEST NEGATIVNÍ

Opakovat POC Ag test za 5 dní.

¹ Test se provádí, pokud není k dispozici možnost provedení PCR ve statimovém režimu u klientů se závažnými příznaky respiračního onemocnění.

² Test se provádí, pokud není k dispozici možnost provedení PCR testu (např. z kapacitních důvodů) v běžném režimu.

³ Testování se provádí v režimu sériového testování, tj. opakuje se v pravidelných intervalech u všech osob dle aktuálně platného MO

Algoritmus se používá v souladu s platným MO OOVZ a aktuálně vyhlášeným stupněm pohotovosti 2 – 3 (komunitní přenos)

Dodržujte návod výrobce.
Používejte antigenní testy (POC Ag) s certifikací CE IVD a s citlivostí > 90% a specificitou > 97%.